

Bijlage I – Indicaties en definities voor het lijmrrestprotocol

Deze bijlage biedt een gestructureerd overzicht van medische indicaties en huidproblemen die relevant zijn voor het lijmrrestprotocol bij stomazorg. De lijst is opgesteld op basis van de richtlijn stomazorg Nederland. Houd er rekening mee dat niet voor elke genoemde indicatie een standaarddefinitie beschikbaar is; in die gevallen zijn de definities daarom niet opgenomen.

Indicaties Alinea 4 en 5

- Decubitus: Een gelokaliseerde beschadiging van de huid en/of het onderliggende weefsel, meestal ter hoogte van een botuitsteeksel. Dit ontstaat door druk, eventueel in combinatie met schuifkrachten.
- Ulceratie: Een defect in de huid waarbij het oppervlakkige epitheel is verdwenen en er een zweer of wond ontstaat. Kenmerkend zijn roodheid, pijn en soms verlies van vocht.
- Pyoderma gangrenosum: Een ulceratieve huidafwijking in de omgeving van de stoma zonder bekende oorzaak.
- Chemotherapie en/of radiotherapie behandeling: Huidproblemen die kunnen ontstaan als gevolg van behandelingen met chemotherapie of radiotherapie.
- Bloeding huid onder huidplak i.c.m. antistolling: Het optreden van een bloeding van de huid onder de huidplak, in combinatie met het gebruik van antistollingsmedicatie.
- Stoma varices: Grote, zichtbare porto-systemische veneuze collaterale bloedvaten die zich naast de stoma bevinden.
- Folliculitis: Ontsteking van de haarfollikels in de peristomale huid, meestal veroorzaakt door de bacterie *Staphylococcus Aureus*.
- Candidiasis of andere schimmelinfectie: Overgroei van schimmels, zoals *Candida*, wat leidt tot infectie van de huid rondom de stoma.
- Erytheem: Verkleuring van de huid zonder verdere afwijkingen.
- Maceratie: Een verweking en nattend worden van de huid.
- Erosie: Een oppervlakkig defect van de huid, vergelijkbaar met een schaafwond, beperkt tot de epidermis.
- Stripeffect: Een oppervlakkig defect (schaafwond gelijkend), beperkt tot de epidermis. Dit wordt veroorzaakt door het te vaak of onzorgvuldig verwijderen van de huidplaat, waardoor de epidermis beschadigd raakt.
- Hyperkeratose: Wratachtige beschadigingen rondom de stoma als gevolg van chronische blootstelling aan vocht en irritatie.
- Granulomen: Vorming van kleine, goedaardige gezwellen rondom de stoma.
- Contactdermatitis: Beschadiging van de huid door blootstelling aan ontlasting, urine of chemische preparaten.

Voor een volledig overzicht van complicaties en problemen wordt verwezen naar bijlage XVII in de richtlijn stomazorg.

Bronvermelding

Smelt, J. J. G., Baas, H. G., Beekhuizen, H., Bremer-Goossens, T., V&VN Stomaverpleegkundigen, & Werkgroep herziening. (2012). *Richtlijn stomazorg*.

